



مختصر الاسعافات الاولية في حالة التسمم

اعداد

د. هاله عبد السلام شتا
مدرس التمريض الباطنی الجراحي
كلية التمريض- جامعة بنها



التسمم عن طريق الجلد:

- ◆ ارتدى القفازين
- ◆ ازل ملابس المصايب المعرضة للمادة السامة.
- ◆ اغسل الجلد بماء جارى.
- ◆ فى حالة التسمم بالفينول ضع زيت الزيتون قبل الغسل.
- ◆ فى حالة المبيد الحشري اغسل بالماء والصابون.

جرعه الدواء الزائدة:

- ينقل المريض للمستشفى فى الحال.

بعض أنواع المقينات ومضادات مفعول السامة :

المقينات :

- 1- تعطى فور تناول المريض السم كإسعاف أولى وهو مادة تسبب القيء فتساعد على خروج ما في المعدة مثل : (ماء مذاب فيه ملح).
- 2- مضادات المفعول أو المواد التي تعادل مفعول المادة السامة مثل في حالة الحامض يستخدم محلول سلفات المانيزيا وبيكربونات الصودا إذا كان التسمم من مادة كاوية قلوية يعطى المصايب محلول الخل أو عصير ليمون.
- 3- مواد ملطفة : تعطى بعد القيء مثل اللبن وزيت الزيتون وزيت البرافين .
- 4- مواد منشطة : تعطى القهوة في حالة السامة المخدرة بعد القيء . في حالة السم بالمواد الكاوية لا يعطى المصايب مضادات للقيء ويعطى المادة المبطلة لمفعول السم بعد التعرف على نوعها أما إذا لم يتم التعرف عليها يعطى المصايب جرارات من الماء لتخفيف السم كما تعطى مادة ملطفة لتخفيف التهاب الأغشية المخاطية - ثم علاج الصدمة إذا وجدت .

تجنب التقيؤ المتعدد في الحالات الآتية:

فقد الوعي.

المصاب بأزمة قلبية أو من له تاريخ مرض قلبي.

المصاب بالصرع.

ابتلاع المواد الكيميائية أو البترولية.

ابتلاع المواد الحارقة أو الأحماض.

التسمم

دخول مادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية إلى الجسم بكمية تحدث خللاً في بعض وظائفه الحيوية وقد تسبب الوفاة.

اعراض التسمم:

تظهر اعراض التسمم في معظم الاحوال بصورة مفاجئة وتتوقف على نوع التسمم وطريقه الاصابه وهى:

غثيان وفقدان الشهيه.

زيادة اللعاب والعرق.

تشنجات عصبية.

تنفس غير طبيعي وررقه في الجلد.

ارتفاع او انخفاض في درجه الحرارة.

اختلال في ضربات القلب.

نزيف داخلي او خارجي.

اتساع حدقة العين او ضيقها.

فقدان الوعي وغيبوبه.

الإسعاف الأولي للتسمم:

لا تنتظر ظهور الاعراض واتصل بالإسعاف / مركز السموم.

حافظ على بقایا الطعام والشراب والدواء للتعرف على السم.

اتبع أساسيات الإسعافات الأولية.

دفع المريض للتقيؤ (حالة بلع السم) ولو بعد 3-4 ساعات.

التسمم عن طريق الفم:

- تناول الماء او اللبن.

- نقل المصاب للمستشفى.

في حالة تناول المواد الحارقة أو الأكلة، يمكن إعطاء المصاب الوعي كوب إلى كوبين من اللبن أو الماء مما يقلل التأثير على الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز الهضمي.

ملحوظة:

أعط المصاب كأسين من اللبن أو الماء (الطفل الأقل من خمس سنوات كأساً واحدة).

التسمم باستنشاق المادة السامة:

- انقل المصاب للهواء النقي.

- يغلق مصدر الغاز او الدخان.

- أخلع ملابس المصاب اذا كانت ضاغطة على الجسم وفك رباط الرقبة واخلع الحذاء.

- لف المصاب ببطانية لتغطيته.

- في حالة فقدان الوعي تأكيد من وجود تنفس ونبض اذا لزم الامر قم بالإنعاش القلبي الرئوي (تنفس صناعي).

عرض العين للمادة السامة:

- تغسل العين بماء جاري لمدة 10 دقائق على الاقل من الداخل للخارج.

- لا تستعمل اي نوع من قطرات.